



Péče o zvěř I.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Chov a ochrana zvěře

- zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.
- vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
- vyhláška 553/2004 Sb. o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Chov zvěře

- záměrná činnost myslivce směřující k zabezpečení a zlepšení životních podmínek zvěře
- zlepšení jakostního stavu zvěře
- chovný cíl
- možnosti dosažení chovného cíle
- zajištění klidových a krytových podmínek

Honitba

- min 500 ha
- souvislé honební pozemky
- obora 50 ha
- honitby lesní, polní, smíšené
- proces tvorby honiteb, uznání honiteb
- honitba vlastní x honitba společenstevní
- uživatel x držitel
- normované a minimální stavy
- cílové stavy

Klasifikace honiteb

- kvalita honitby pro jednotlivé druhy zvěře
- stavy zvěře mají odpovídat úživnostním, ekologickým a celospolečenským podmínkám
- škody způsobené zvěří
- jakostní třídy honiteb pro zvěř spárkatou a drobnou
- pro polní a smíšené honitby se vychází ze zemědělských oblastí
- pro lesní honitby se vychází z celkové charakteristiky lesů

Poměr pohlaví

- 1:1 u jednotlivých druhů spárkaté zvěře
- u kamzíka 1:2 i širší
- 1:1 u koroptví
- 1:3 až 1:6 u bažanta ve volnosti
- 1:6 až 1:8 v bažantnici

Úživnost honitby

- kvantitativní a kvalitativní
- pojem únosná škody
- zvyšování úživnosti honitby
- zvěřní louky
- políčka pro zvěř, v lesních honitbách 4-5 %
- osevní postup
- pastevní a okusová políčka
- okus, ohryz a loupání

Remízky

- trvalé a dočasné
- kryty trvalé, souhlas vlastníka a odboru
životního prostředí, 3 patra – bylinné, keřové
a stromové
- kryty dočasné – 1 i víceleté rostliny
- zákaz vypalování staré trávy
- rohatiny
- vhodné zdroje vody

Minimální, normované a kmenové stavy zvěře

- MS – druh není ohrožen na existenci a jeho populační hustota zabezpečuje biologickou reprodukci druhu
- NS – nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá kvalitě životního prostředí zvěře a úživnosti honitby
- uvádí se pro jakostní třídu honitby
- požadovaný poměr pohlaví, věková skladba populace a koeficient očekávané produkce
- kmenový stav = skutečný stav zjištěný sčítáním

Oblasti chovu zvěře

- návrh jednoho nebo více uživatelů honiteb
- nezakládají se pro zvěř srnčí, jelence a prasete
- soubor honiteb s přibližně stejně vhodnými přírodními podmínkami pro chov určitého druhu spárkaté zvěře
- pro vzácné druhy tetřev, tetřívek a jeřábek
- přínos oblastí chovu

Sčítání zvěře

- metody přímé a nepřímé
- povinnost výsledek písemně oznámit do 5 dnů orgánu státní správy myslivosti
- spárkatá se sčítá v lednu a únoru, drobná zvěř se sčítá v zimně, koncem léta a začátkem podzimu
- počítání trusu
- počítání stop
- pobytová znamení
- termovize
- letecké sčítání
- termíny (k 31. 3.)

Plán mysliveckého hospodaření

- povinnost vypracovat má každoročně uživatel honitby
- zpracovávají se pro jednotlivé druhy zvěře
- průběrný odstřel
- osvěžování krve
- přilití krve

Chov zvěře spárkaté

Jelení zvěř

- kmenové stavy
- poměr pohlaví 1:1
- 3 věkové třídy
- I. - 35-40 %
- II. - 40-45 %
- III. – 20 %
- z chovu vyřazujeme kusy slabé nemocné, špičáky do slechů, silné jeleny po říji

Daňčí zvěř

- kmenové stavy
- 3 věkové třídy
- 40 % daňků, 40 % daněl a 20 % daňčat
- kulminace tvorby paroží 7 rok
- z chovu odstraňujeme daňky slabé, nemocné s nežádoucím tvarem paroží

Srnčí zvěř

- jarní kmenový stav se zjišťuje přímým pozorováním
- 3 věkové třídy
- trofejově silné trofeje mají srnci ve III. věkové třídě 25 %
- lov I. 50 %, II. 20 % a III. 30 %
- při lovu se upřednostňují slabé a nemocné kusy

Mufloní zvěř

- poměr pohlaví 1:1
- 3 věkové třídy
- při lovu preferujeme zvěř slabou, nemocnou, muflony se žlutavými toulci, s vlnitou srstí, vrůstavé berany, vývrtkově vyvinuté toulce,
- rozloha a rozpětí toulců, $C - \text{index} = \text{rozloha} / \text{rozpětí}$ nesmí být menší než 0,7

Černá zvěř

- problém zjištění kmenových stavů zvěře
- velký přírůstek 300 – 400 %
- narušená struktura populace
- odstřel 75 % selat, 15 % lončáků
- pojem přemnožená černá zvěř a návrh opatření MZe

Chov zvěře v oborách

- min 50 ha
- pro jelení 800 ha, daňčí 500 ha, mufloní a černá 200 ha
- druhy zvěře se musejí snášet a nesmějí si konkurovat (např. daněk a muflon)
- obora musí být trvale oplocena
- dostatek vodních zdrojů (napajedel pro zvěř)
- aklimatizační obůrky

Zajíc

- poměr pohlaví 1:3 až 1:4
- komora zvěře obvykle 1/5 honitby

Bažant

- divoký chov
- polodivoký chov
- krotký chov

Koroptve

- bioindikátor životního prostředí
- dotační programy pro koroptve

Divoké kachny

- umělá hnízda
- plovoucí ostrůvky
- důležitost příkrmování